



A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetség Egyesületének a logopédiai ellátásra vonatkozó ajánlásai a Covid-19 vírussal kapcsolatban a 2020-2021-es tanévre.

Ajánlások a logopédiai tevékenységek végzéséhez a köznevelés területén működő szakemberek számára

A logopédia szerteágazó tevékenységet foglal magában. Az ellátások formái és módszerei eltérőek, attól függően, hogy a gyermek/kliens, milyen terápiában vesz részt. Ezekhez illeszkedve az egészségügyi szabályok betartása és betartatása is eltérő lehet.

Általános javaslatok

A logopédiai diagnosztika/terápia/tanácsadás helyszínét biztosító intézmény számára kidolgozott Covid-19 protokoll elfogadásán túl a logopédiai diagnosztikára/terápiára/tanácsadásra való belépéskor a logopédusoknak kötelező a kézfertőtlenítés, kísérőknek pedig ezen felül a közösségi terekben az arcmaszk vagy azt helyettesítő védőeszköz használata.

Logopédusok számára, valamint indokolt esetben 12 év feletti klienseknek ajánljuk a fejpántos műanyag arcvédő pajzs vagy átlátható arcpajzs használatát.

Kisebbségi gyermekekkel történő terápia esetén (az egymással szemben történő foglalkozások alatt) megoldás lehet egy asztalra helyezett, kb. 60x60 cm-es, 3-4 mm vastag, víztiszta plexi lap.

Indoklás: A legtöbb ellátás az artikuláció javítása területén várható (ezt a felmérések is alátámasztják), ezért ez az egyik legfontosabb eszköz (arcpajzs/plexi lap), amit minden logopédusnak használnia kell a logopédiai „oktatási helyzetben”, mert a gyermeknek/kliensnek fontos látnia a terápiát végző logopédusa száját, és természetesen a logopédusnak is a gyermekét/kliensét.

Lehetőség szerint legyen biztosított a fertőtlenítő kendő vagy fertőtlenítő folyadék, papírtörölköző a terápiás szobákban is. Szükség esetén - pl. hangfejlesztés, nyelvlökéses nyelés terápia - gumikesztyű használatát javasoljuk.

Indoklás: A kendővel az arc, a folyadékkal a kéz és a kar is áttörölhető. A logopédus és a gyermek/kliens közelsége miatt (10-15 cm) a terápiás órán ezek a testrészek gyakran „érintettek” lehetnek. Direkt hangfejlesztés és nyelvlökéses nyelés terápia során sokszor kell hozzáérnie a logopédusnak a gyermek/kliens szájához, ez viszont kizárólag gumikesztyűben javasolt.



Logopédiai tevékenység (szűrés, vizsgálat, tanácsadás, terápia) alatt és a várakozás esetén kérjük meg a jelenlévő szülőt, hogy viseljen maszkot.

Konkrét ajánlások a logopédus kollégák részére

Szűrés/vizsgálat idejére:

- A szűrés/vizsgálatot egyénileg, lehetőleg arcpajzsban végezzük.
- A szűrés/vizsgálat ideje alatt végig tartsuk be a másfél méteres védőtávolságot.
- Minden gyermek után töröljük le fertőtlenítővel a tükröt, az asztalt és a használt eszközöket.
- Ha a technikai és a személyi feltételek adottak, az elkért e-mail címek alapján tartunk online fogadóórát (egyénileg).
- Ha valaki nem tud online fogadóórán részt venni (technikai akadály stb.), tartsuk meg azt egyénileg, az egészségügyi szabályok szigorú betartásával (maszk, fertőtlenítő stb.), vagy telefonon keresztül beszéljünk a szülővel.

A terápia idejére:

- A terápiára való felvétel előtt még hangsúlyozottabban vegyük figyelembe a klinikai kórkép szerinti súlyossági sorrendet.
- Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy csak egy kísérő hozza a gyermeket a foglalkozásra.
- A távolságtartás miatt át kell gondolni a csoportbeosztásokat, ezért a helyiség nagyságától, szellőztetési lehetőségétől függően osszuk be a gyerekeket, a létszám és a heti óraszám függvényében. Ablaktalan helyiségben, ahol a szellőztetés nem megoldott, logopédiai ellátást ne végezzünk. Ezt egyénileg egyeztessük a közvetlen felettséssel.
- Logopédiai ellátás során törekedjünk a másfél méteres védőtávolság betartására. Ha ez nem megoldható, vezetőnkkel egyeztetve kezdeményezzük az osztott foglalkozások tartását.
- Csoportos logopédiai terápiára lehetőleg ugyanabból a bölcsődei/óvodai csoportból/iskolai osztályból szervezzünk gyerekeket.
- Artikulációs- és a nyelvlökéses nyelés terápiát a gyermekek védelme érdekében lehetőleg arcpajzsban végezzünk, részesítsük előnyben az indirekt módszereket. Lehetőség szerint használjunk gumikesztyűt.
- A pajzsot, tükröt, asztalt, a terápia során használt eszközöket minden óra után fertőtlenítsük és szellőztessünk.
- Amennyiben bölcsődében, óvodában, iskolában történik az ellátás, kérjük az intézmény vezetőjének segítségét az egészségügyi szabályok minél fokozottabb betartására (fertőtlenítési lehetőségek biztosítása). Ha ezt nem tudják biztosítani, kérjük a közvetlen vezetőnk hathatós intézkedését.



- Hívjuk fel a szülők figyelmét, hogy betegen ne hozzák a gyermeket a foglalkozásra.
- A szülőkkel lehetőleg online tartsuk a kapcsolatot.
- Alapos kézmosást/kézfertőtlenítést javasolunk minden logopédiai tevékenységen résztvevőnek.

Budapest, 2020. szeptember 1.

Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület
elnöksége